

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ КОЛЬЧАТОЙ ГОРЛИЦЫ.

Кольчатая горлица (*Streptopelia decaocto* Frivald.) - голубь, по размерам лишь немного уступающий сизому, отличающийся общей грязно-розовой окраской оперения и черным полуколымом на шее сзади. В последние годы эта горлица активно расселяется, расширяя свой гнездовой ареал (Второв, Дроздов, 1980).

Сравнительно недавно кольчатая горлица в Самарской области и даже шире - в пределах Волжско-Камского края - не отмечалась (Горшков, 1977) либо считалась залетным видом, поскольку встречи с ней были единичными (Горелов, 1990).

Новые сообщения, с одной стороны, дополняют знания о составе орнитофауны области, с другой - будут способствовать дальнейшему более активному поиску и сбору информации по данному вопросу.

По нашим наблюдениям, горлица кольчатая отмечалась весной 1984 года на одном из стадионов г. Самары (тогда г. Куйбышева). Здесь нами (с Ю.К. Рощевским и А.В. Гуриненко) встречены две пары этих птиц и наблюдались токовые полеты самцов.

Ежегодное, начиная с 1984г., гнездование кольчатой горлицы в пос. Зубчаниновка, пригороде Самары, наблюдала сотрудник Самарского областного краеведческого музея И.М.Стрижова (устное сообщение).

И, наконец, еще одна встреча этой птицы в Самарской области состоялась в с. Августовка Большечерниговского района с 8 по 10 мая 1991 года. Ежедневно, каждое утро, ворковавшие горлицы сидели в кронах деревьев, росших рядом с гостиницей, где жили участники нашей экспедиции. Насчитывалось до 5 пар кольчатых горлиц.

Таким образом, на основании литературных данных, собственных наблюдений и устных сообщений можно предположить, что горлица кольчатая в Самарской области в настоящее время - гнездящийся, но редкий вид (рис.1).

